

இந்தத் திட்டத்தை உங்களுடன் வைத்திருந்து உங்கள் குடும்ப வைத்தியரின் சிகிச்சை இடத்தில் (அல்லது வைத்தியசாலையில்) வைத்தியரை அல்லது நாதியைக் காண்கின்ற ஒவ்வொரு நடவடிக்கை எடுத்துச் செய்வோம். இந்தத் திட்டம் ஆஸ்துமா அல்லது இழும்பு உள்ள போயாஸிசுக்கானது – உங்கள் குடும்ப வைத்தியர் / வைத்தியர் (அல்லது நாதி) அதனை நிரம்பி உங்கள் ஆஸ்துமா போயைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான வெவ்வேறு மருந்துகள் பற்றி விளக்குவார்கள். ஆஸ்துமா அல்லது இழும்பு போய் மேலமடையும்போது அதனை எவ்வாறு அறிந்துகொள்வது எனவும் அது பற்றி என்ன செய்யலாம் எனவும் அது காட்டும். ஆய்ப்பத்திலேயே நடவடிக்கைகளை எடுப்பதன் மூலமாக – கடுமான தாக்குதல்கள் வறுமையாகத் தடுத்துக்கொள்ளப்படும்.

**தயவுசெய்து விபரங்களைக் கீழே எழுதவும் ( மற்றும் / அல்லது அடையாளச் சீட்டை இணைக்கவும்):**

நோயாளியின் பெயர் ..... .பிறந்த தேதி \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

குடும்ப வைத்தியர் சிகிச்சை இடம் ..... .தொலைபேசி: \_\_\_\_\_

குடும்ப வைத்தியர் / ஆஸ்துமா நாதி .....

மற்றும் / அல்லது வைத்தியசாலை வைத்தியர் / ஆஸ்துமா நாதி .....

படிவம் நிரப்பப்பட்ட தேதி \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ தொழிலறிஞரின் பெயர் .....

தொழிலறிஞரின் கையொப்பம்..... .மறுபரிசீலனையின் தேதி \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_


A"ach label

**ஆஸ்துமா இன்ஹேலருடன் ஸ்பேசர் (அழுத்தமிடப்பட்டு மீட்டரைக் கொண்டுள்ள அளவு சாதனம்) என்பதைப் பாவிப்பதற்கான சாதாரண நுட்பம்:**

முக மூடியுடன் உள்ள போகும்போது அளவிலான ஸ்பேசரைத் தெரிந்தெடுக்கவும் (அல்லது பின்னை நல்ல நுட்பத்துடன் 4 வயதுள்ளவராக மற்றும் குறிப்பிடத்தக்களவில் மூச்சு விடுதல் கஷ்டம் இல்லாதவர் என்றால் வாய்த் துள்ளுடல் பயன்படுத்தவும்)



- 1 இன்ஹேலரை நன்றாகக் குறுக்கி மூடியை அகற்றவும்.
  - 2 ஸ்பேசரின் முடிவுப் பகுதியில் உள்ள இடைவெளிக்குள் இன்ஹேலரைப் போடுதல்.
  - 3 நன்றாக மூடப்படுவதற்காக, பின்னையின் முகம் மீது ஒரு முக மூடியை அல்லது ஒரு வாய்ப்புறத்தை அகல்களின் வாயில் போடவும்.
  - 4 இன்ஹேலரை ஒரு நடவை அழுத்தி ஒவ்வொரு மருந்துக்கு இடையிலும் 5 மெதுவான ஆரமான மூச்சுக்களை பின்னை எடுக்க விடவும்.
  - 5 இன்ஹேலரை அகற்றி ஒவ்வொரு இரண்டு அத்துக்களுக்குக்கிடையிலும் குறுக்கவும்.
- அடுத்து வரும் மருந்து அளவுகளுக்காக 2 –6 படிகளைத் திருப்பிச் செய்யவும்.



**உங்கள் ஆஸ்துமா / இழும்பு நோய் எப்படி உள்ளது? (போக்குவரத்து வெளிச்ச அறிவுரை)**

	<b>நோய்க் குறிகள்</b>	<b>உங்கள் நுட்ப வடிக்கை:</b>
<b>லேசானது</b>	<p>நீங்கள் / உங்கள் பின்னை :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• நாள் முழுவதும் இருமலுக்காக அல்லது இழும்புக்காக 4 மணித்தியாலங்களுக்குக் குறைவான நேரத்தில் நிவீவர் மூலமான 2-6 ஊதுக்களைப் பாவிக்க வேண்டி ஆனால் வினாவாகச் சுவாசிக்க, தொடர்ந்து அன்றாடச் செயல்களைச் செய்ய, முழு வசனங்களில் பேச முடியவில்லை.</li> </ul>	<p><b>அடுத்த நாள் பார்க்கப்படுவதற்காக, ஒரு நியமனத்தைச் செய்வதற்கு உங்கள் குடும்ப வைத்தியரைத் தொலைபேசியில் தொடர்புகொள்ளவும்.</b> மாறாக, குடும்ப வைத்தியரைத் தொடர்புகொள்ள முடியாவிட்டால், 24 மணித்தியால அறிவுரைக்காக 111ஐ அழைக்கவும்.</p>
<b>நடுத்தரமானது</b>	<p>நீங்கள் / உங்கள் பின்னை:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• இழும்பை மற்றும் மூச்சுவிட முடியாமையை அனுபவித்தால், வறுமையான நிவீவர் சிகிச்சை 4 மணித்தியாலங்களுக்கு நீடிக்கவில்லை.</li> <li>• பகலிலும் இரவிலும் இருமல் அல்லது இழும்பு நோய்க் குறிகளை அனுபவித்தால்</li> </ul>	<p>நிவீவர் வழியாக 2-10 தடவைகள் ஊதவும். அந்த நாளில் உங்கள் பின்னை நோடியாகப் பார்க்கப்படுவதற்காக உடனடியாக ஜீப்பைத் தொடர்புகொண்டு ஒரு நியமனத்தைச் செய்யவும். மாறாக, உங்கள் ஜீப்பைத் தொடர்புகொள்ள முடியாவிட்டால், 24 மணித்தியால அறிவுரைக்கு 111ஐ அழைக்கவும்.</p>
<b>கடுமையானது</b>	<p>கடுமையாக மூச்சுவிட முடியாதிருந்து, நீங்கள் / உங்கள் பின்னை:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• பேச முடியாமல் / உண்ண அல்லது குடிக்க முடியாமல் இருந்தால்.</li> <li>• ஓட முடியாமல் மற்றும் வினையாட முடியாமல் இருந்தால்</li> <li>• மேலமடையும் இருமல்/ இழும்பு அல்லது மூச்சுவிட முடியாத குறிகளை அனுபவித்தால்</li> <li>• அல்லது நிவீவர் 4 மணித்தியாலங்களுக்கு நீடிக்கவில்லை அல்லது உதவவில்லை.</li> </ul>	<p>நிவீவர் வழியாகப் 10 தடவைகள் ஊதவும். அம்புலன்ஸ் வரும் வரை 10 நிமிடங்களுக்கு ஒருமுறை அதனைத் திருப்பத் திருப்பச் செய்யவும். விட்டில் உங்களிடம் இருந்தால், ஓரல் மிடுடன் சோலோன் கொடுக்க ஆரம்பிக்கவும்.</p> <p><b>உடனடியான உதவிக்கு (ஒரு கைத் தொலைபேசியிலிருந்து) 999ஐ அல்லது 112ஐ அழைக்கவும்.</b></p>
<b>உயிருக்கு ஆபத்தானது</b>	<p>நீங்கள் / உங்கள் பின்னை:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• இருமல் / இழும்பு அல்லது மூச்சுவிட முடியாத நோய்க் குறிகளை கடுமையாகவும் தொடர்ந்தும் அனுபவித்தால்</li> <li>• குழம்பமடைந்து அல்லது அரைத் தூக்கமாக இருந்தால்</li> <li>• அவர்களது நிவீவர் (நீல) இன்ஹேலருக்குப் பதிலளிக்காவிட்டால்</li> </ul>	<p>நிவீவர் வழியாகப் 10 தடவைகள் ஊதவும். அம்புலன்ஸ் வரும் வரை 10 நிமிடங்களுக்கு ஒருமுறை அதனைத் திருப்பத் திருப்பச் செய்யவும். விட்டில் உங்களிடம் இருந்தால், ஓரல் மிடுடன் சோலோன் கொடுக்க ஆரம்பிக்கவும்.</p> <p><b>உடனடியான உதவிக்கு (ஒரு கைத் தொலைபேசியிலிருந்து) 999ஐ அல்லது 112ஐ அழைக்கவும்.</b></p>



**ஜீப் சிகிச்சை இடம்**  
(எண்ண இங்கே குறித்துக்கொள்ளவும்)

**எனீசீஎஸ் 111**  
111ஐ அழைக்கவும்  
(ஒரு வாரத்தில் 7 நாட்கள் - 24 மணித்தியாலங்கள் உள்ளது)

**பாடசாலை நாதி / டோல்க் விசிப்டர் குழு**  
(எண்ண இங்கே குறித்துக்கொள்ளவும்)

**கனிலி மூலான அறிவுரை:** NHS Choices [www.nhs.uk](http://www.nhs.uk)  
(ஒரு வாரத்தில் 7 நாட்கள் 24 மணித்தியாலங்கள் உள்ளது)

**குடும்ப ஆதரவுச் சேவை :** குடும்பங்களுக்காக உள்சூர் கவுன்சில்களால் எழுபடுத்தப்பட்ட பானுள்ள தகவலை வழங்கும் கனிலிச் சேவை

உங்களுக்கு மேலி ஆதரவு அல்லது மேலியோர்ப்பு தேவைப்பட்டால், தயவுசெய்து நீங்கள் பேசுகின்ற ஊழியர்களுக்கு அறிவிக்கவும். .

பழிநூல் தடுப்பதற்கு அல்லது இறப்பிற்குள்ளிடு நினைவு அறிவுரைகள் எவ்வாறு பெறலாம் என்பது உட்பட, மேலநி தகவல்களுக்கு, சவுத் ஈஸ்ட் ஈஸ்ட் ஈஸ்ட் கிங்க்டோம்ஸ் லீவ்ர்ப்பு பகுதியின் (கோர்ட்சுமேற்றும் சச்சீஸ்) பீக்ஸ், இந்த விவரணைகளுக்காக ஒரு தயல் பெட்டியை வைத்திருக்கிறீர்கள். தயவுசெய்து ஈமெயில் அனுப்பவும்: [CWSCCG.cypSECPATHWAYS@nhs.net](mailto:CWSCCG.cypSECPATHWAYS@nhs.net)

இது ஆஸ்துமா / இழுப்பு தனிப்பட்ட ஆஸ்துமா நடவடிக்கைத் திட்டம்- கீழுள்ளவருக்கானது

புரத்திசெய்யப்பட்ட பகுதிகள் மாத்திரம் மேலுள்ள பிள்ளை / இளம் நபருக்குப் பொருந்தும்

**உங்கள் ஆஸ்துமா கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது :**

- இவ்வில் அல்லது பசுவில் உங்களுக்கு நோய்க் குறிகள் இல்லை (இழுப்பு, இருமல், மூச்சு குறைவு, மர்ப்பு இறக்கம்).
- நோய்க் குறிகள் இல்லாமல் உங்கள் சாதாரண செயற்பாடுகள் அனைத்தையும் நீங்கள் செய்ய முடியும்.
- நீலவர் இன்ஹேலர் (சப்பு மோல்) உங்களுக்கு அல்லது உங்கள் பிள்ளைக்குத் தேவையில்லை.

**சிகிச்சை**

ஆறுதல் அளித்தல் (நீலவர்) சிகிச்சையின் பெயர்:..... இன்ஹேலரின் நிறம் : .....

இன்ஹேலர் கருவியின் / ஸ்பேசரின் பெயர்: .....

அது என்ன செய்கிறது? நீலவேர்ஸ் ஒய்வுபெற உதவுகின்றன மற்றும் இழுப்பின்போது காற்று வழிகளைத் திறக்கின்றன.

நோய்ப்பிடுங்கு பனிக்கூட்டினென்றும் – நோய்க் குறிகள் ஏற்படும்போது எடுக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு 4 மணிகளுக்கு ஒரு நடவை திரும்பச் செய்யப்பட வேண்டும். 10 ஊதுதல்கள் கொடுக்கப்படக்கூடியதான கடுமையான ஆஸ்துமா/ இழுப்பு வருத்தத்தை உங்கள் பிள்ளை அனுபவித்தாலே தவிர, 4 மணிகளுக்கு ஒரு முறை 4 ஊதுதல்களுக்கு மேலாக அளவு இருக்கக்கூடாது. 10 ஊதுதல்களுக்கு அதிகரிப்பதற்கான தேவை உங்களுக்கு இருந்தால், மருத்துவ உதவி தேடவும்.

ஒரு தடுமன் ஆரம்பித்ததும் அல்லது உங்கள் இருமலை, இழுப்பை அல்லது மூச்சுக் குறைவை முடுக்கி விடும் எதற்கும் முன்னராக இந்த இன்ஹேலரைப் பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கவும்.

வழமையான முறையில் ஒரு ஸ்பேசர் மூலமாகப் பயன்படுத்தவும்: ஆம் / இல்லை

எந்த 1 மாதத்திலும் 1க்கு மேற்பட்ட இன்ஹேலர் உங்களுக்குத் தேவையானால், உங்கள் வைத்தியரை அல்லது ஆஸ்துமா தாதியைக் காணவும்.

நீலவர் சிகிச்சையின் பெயர் :.....பலம்:.....இன்ஹேலரின் நிறம்:.....

அது என்ன செய்கிறது? தடுப்பு இன்ஹேலர்கள் என்பவை கரிமப் பொருட்கள். அவை அழற்சியைத் தடுப்பவை. மேலும், உங்கள் அல்லது உங்கள் பிள்ளையின் காற்று வழிகளில் வீக்கத்தை மற்றும் அழற்சியைக் குறைக்க உதவுகின்றன. இதன் காரணமாகவே, நோய்க்குறிகள் இல்லாதிருக்கும்போது கூட அவை ஒழுங்கான முறையில் எடுக்கப்பட வேண்டும்.

..... ஊதுதல்கள் ஒரு நாளில் இரு நடவைகள் ஒழுங்காக எடுக்கப்பட வேண்டும். நோய்க் குறிகள் இல்லாவிட்டாலும் கூட, காலையிலும் மாலையிலும் இந்த இன்ஹேலரை எடுக்கவும்.

இந்த மருந்து ஒரு கரிமப் பொருள் என்பதால், அதற்குப் பின்னர் உங்கள் பற்களைச் சுத்தம் செய்யவும் அல்லது உங்கள் வாயைக் கழுவவும்.

ஒரு வைத்தியரால் அல்லது தாதியால் அறிவுரை அளிக்கப்பட்டாலே தவிர, நீங்கள் நலமாக இருந்தாலும் உங்கள் தடுத்தல் சிகிச்சையை நிறுத்த வேண்டாம்.

வழமையான முறையில் ஒரு ஸ்பேசர் மூலமாகப் பயன்படுத்தவும்: ஆம் / இல்லை

நீங்கள் இந்த ஒன்றைப் பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கும்போது ஒரு மேலதிக இன்ஹேலரை வைத்திருக்கவும், ஒரு புதிய ஒன்றை வேண்டிக்கொள்ளவும்.

**மேலதிக தடுத்தல் சிகிச்சை:**

பெயரும் அளவும்

பெயரும் அளவும்:

**உச்ச நிலை அளவு** (6 வயதுக்கு மேற்பட்ட பிள்ளைகள்) –நோய்க்குறிகள் மோசமடைந்தால், 3 உச்ச நிலை அளவு வாசிப்புக்களில் சிறந்தது காலையிலும் மாலையிலும் நீல இன்ஹேலர் (ஆறுதல் அளிப்புச் சிகிச்சை) கொடுக்கப்படுவதற்கு முன்னர் அளவிடப்படலாம்:

எப்போதும் சிறந்த உச்ச நிலை அளவு ..... 1/நிமிடம் (100%)  
 எதிர்பார்க்கப்படும் உச்ச நிலை அளவு ..... 1/நிமிடம்  
 உச்சநிலை அளவுக்குக் கீழாக இருந்தல், உங்கள் ஆஸ்துமா கட்டுப்படுத்தப்படவில்லை  
 ..... (சிறந்ததில் அல்லது எதிர்பார்க்கப்பட்டதில் 80%)

**உங்களை அல்லது இழுப்பு / ஆஸ்துமா உள்ள உங்கள் பிள்ளையைக் கவனித்தல்**

- உங்கள் பிள்ளை அவரது நீலவர் (நீலம்) இன்ஹேலரை எப்போதும் பெற்றுக்கொள்கிறார் எனப் பார்த்துக்கொள்ளவும்.
- அது எப்போதும் உள்ளது எனப் பார்த்துக்கொள்ள, உங்கள் பிள்ளைக்கான ஒரு (ஸ்பேசர் உள்ள / இல்லாத) மேலதிக நீலவர் இன்ஹேலரைப் பாடசாலையில் விடுவதற்கு நினைவுகொள்ளவும்.
- வீட்டிலிருந்து பயணங்களின்போது உங்களுடன் அல்லது உங்கள் பிள்ளையுடன் இன்ஹேலரைக் கொண்டுசெல்லவும்.
- உங்களுக்கும் உங்கள் பிள்ளைக்குமாகச் சிபார்சு செய்யப்பட்ட சரியான இன்ஹேலர் கருவியை எப்போதும் பாவிக்கவும்.
- ஒரு அவசர நிலையில் ஆறுதல் அளிப்பு சிகிச்சையை வழங்க சிறந்த வழி ஒரு ஸ்பேசர் என்பதை நினைவுகொள்ளவும்.
- அடுத்து வரும் நியமனங்கள் எதற்கும் செல்வதற்கு நினைவுகொள்ளவும்.

**எனது முடுக்கிகள் :**

இருமலும் தடுமனும் .....	6
கிகறட்ட புகை .....	6
உடற் பயிற்சி .....	6
குளிர் காலநிலை .....	6
வளர்ப்பு பிராணி மயிர்/ இறகுகள் .....	6
தூசி .....	6
மகரந்தத் தூள் .....	6
மாகபடுதல் .....	6
உணர்ச்சிகள் .....	6
புஞ்சணம் மற்றும் நுண்ணுயிர்கள் .....	6
எனையது .....	6